



LIVISTO

FIPREx® DUO

Antiparassitario Spot-on
per cani, gatti e furetti.



**PROTEZIONE DEL CANE CONTRO PULCI
PIDOCCHI E ZECHE E DALLE PULCI
DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE DOPO
L'APPLICAZIONE SULL'ANIMALE**

Per l'azione combinata di due principi attivi.

FIPREX DUO Spot-on è una soluzione insetticida e acaricida in forma spot-on per CANI, GATTI E FURETTI. Per la combinazione dei suoi due principi attivi, Fipronil e (S)-methoprene, è attivo su zecche, pidocchi, pulci adulte ma anche uova e larve di pulci per impedire la comparsa di nuovi parassiti.

Il **Fipronil** agisce su particolari recettori provocando un'attività incontrollata del sistema nervoso centrale determinando la **morte delle pulci entro 24 ore** e quella di **zecche e pidocchi entro 48 ore** dall'esposizione. **(S)-methoprene** è un regolatore di crescita degli insetti.

Indicazioni nei Cani

- Da utilizzare contro le infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori.
- Trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'azione insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 8 settimane. Prevenzione della moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo di uova (attività ovicida) e larve e pupe (attività larvicida) originate da uova deposte da pulci adulte per otto settimane dopo l'applicazione sull'animale.
- Trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'azione acaricida persistente fino a 4 settimane contro le zecche.
- Trattamento delle infestazioni da pidocchi (*Trichodectes canis*).
- Il prodotto può essere usato anche durante la gravidanza e l'allattamento.

Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della dermatite allergica da pulci (FAD), dove questa è stata precedentemente diagnosticata da un veterinario. FIPREX DUO per CANI: non usare su cuccioli di peso inferiore ai 2 kg e/o di età inferiore alle 8 settimane. Non usare nei conigli e su gatti o furetti.

**Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
Chiedi consiglio al tuo medico Veterinario.**



FIPREx[®] per Cani DUO

LIVISTO

Protegge i cani di ogni taglia, da **small** a **extra large** e l'ambiente circostante dopo l'applicazione sull'animale.



Da 2 a 10 kg



Da 20 a 40 Kg

Taglia	Nome prodotto	Posologia	Confezione
S	FIPREx DUO S 67 mg + 60,3 mg soluzione spot-on per cani Fipronil/(S)-methoprene	Una pipetta di 0,67 ml per un cane di peso superiore a 2 e fino a 10 kg, corrispondente a una dose minima raccomandata di 6,7 mg/kg per fipronil e 6 mg/kg per (S)-methoprene, mediante applicazione topica cutanea. L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.	Scatola di cartone contenente 1 pipetta da 0,67 ml

Aut. Min. AIC n. 105314025

Taglia	Nome prodotto	Posologia	Confezione
L	FIPREx DUO L 268 mg + 241,2 mg soluzione spot-on per cani Fipronil/(S)-methoprene	Una pipetta di 2,68 ml per un cane di peso superiore a 20 e fino a 40 kg, corrispondente a una dose minima raccomandata di 6,7 mg/kg per fipronil e 6 mg/kg per (S)-methoprene, mediante applicazione topica cutanea. L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.	Scatola di cartone contenente un blister da 1 pipetta da 2,68 ml

Aut. Min. AIC n. 105314064



Da 10 a 20 Kg



Oltre i 40 Kg

Taglia	Nome prodotto	Posologia	Confezione
M	FIPREx DUO M 134 mg + 120,6 mg soluzione spot-on per cani Fipronil/(S)-methoprene	Una pipetta di 1,34 ml per un cane di peso superiore a 10 e fino a 20 kg, corrispondente a una dose minima raccomandata di 6,7 mg/kg per fipronil e 6 mg/kg per (S)-methoprene, mediante applicazione topica cutanea. L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.	Scatola di cartone contenente in un blister 1 pipetta da 1,34 ml

Aut. Min. AIC n. 105314049

Taglia	Nome prodotto	Posologia	Confezione
XL	FIPREx DUO XL 402 mg + 361,8 mg soluzione spot-on per cani Fipronil/(S)-methoprene	Una pipetta di 4,02 ml per un cane di peso superiore a 40 kg, corrispondente a una dose minima raccomandata di 6,7 mg/kg per fipronil e 6 mg/kg per (S)-methoprene, mediante applicazione topica cutanea. L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.	Scatola di cartone contenente 1 pipetta da 4,02 ml

Aut. Min. AIC n. 105314088



per Gatti e Furetto

Indicazioni nei Gatti

- Da utilizzare contro le infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori.
- Eliminazione delle pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'azione insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 4 settimane. Prevenzione della moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo di uova (attività ovidica), larve e pupe (attività larvicida) originate da uova deposte da pulci adulte per sei settimane dopo l'applicazione sull'animale.
- Eliminazione delle zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'azione acaricida persistente fino a 2 settimane contro le zecche (sulla base di dati sperimentali).
- Eliminazione dei pidocchi (*Felicola subrostratus*).

Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della dermatite allergica da pulci (FAD), dove questa è stata precedentemente diagnosticata da un veterinario.

Indicazioni nei Furetto

- Da utilizzare contro le infestazioni da pulci, da sole o in associazione con le zecche.
- Eliminazione delle pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'azione insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 4 settimane.
- Prevenzione della moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo di uova (attività ovidica), larve e pupe (attività larvicida) originate da uova deposte da pulci adulte dopo l'applicazione sull'animale.
- Eliminazione delle zecche (*Ixodes ricinus*). Il prodotto ha un'azione acaricida persistente per 4 settimane contro le zecche (sulla base di dati sperimentali).

Nome prodotto	Specie	Posologia	Confezione
FIPREX DUO 50 mg + 60 mg soluzione spot-on per gatti e furetto Fipronil/ (S)-methoprene	gatto	Una pipetta da 0,5 ml per un gatto, corrispondente a una dose minima raccomandata di 5 mg/kg per fipronil e 6 mg/kg per (S)-methoprene, mediante applicazione topica cutanea. L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.	Scatola di cartone contenente 1 pipetta da 0,5 ml
	furetto	Una pipetta da 0,5 ml per furetto corrispondente a una dose di 50 mg per fipronil e 60 mg per (S)-methoprene per furetto, mediante applicazione topica sulla pelle. L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.	

LIVISTO

Informazioni su FIPREX DUO

Come si utilizza

Tenere la pipetta in posizione verticale e picchiettarne la parte stretta per assicurarsi che il contenuto si raccolga sul fondo. Aprire tirando indietro la punta. Applicare direttamente sulla pelle tra le scapole avendo cura di separare i peli sul dorso dell'animale. Spremere la pipetta più volte per svuotarla completamente e direttamente il contenuto sulla pelle in un unico punto.

FIPREX DUO è un medicinale veterinario senza obbligo di prescrizione. Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la bocca, la pelle e gli occhi. **FIPREX DUO per Gatti e Furetto:** non usare su gattini di età inferiore a 8 settimane e/o di peso inferiore a 1 kg o su furetto di età inferiore a 6 mesi.

Non usare su animali malati (ad es. malattie sistemiche, febbre) o convalescenti. Non usare nei conigli, poiché possono verificarsi reazioni avverse inclusa la morte. Non usare dopo la data di scadenza che è riportata sul cartone e sulla pipetta dopo la voce "Scad."

Chiedi consiglio al tuo medico Veterinario.

Disponibile nei pet shop, nelle farmacie e nei negozi specializzati.

Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Distributore:

INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A.
con unico socio (a LIVISTO company)
Viale Corassori, 62, 41124 Modena
T +39 0522 640711 | F +39 0522649757